

ผิวนังติดเชื้อไวรัส viral infection

โรคผิวนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส มีด้วย กันหลายโรคแบ่งออกเป็น 2 จำพวก ได้แก่ DNA และ RNA ไวรัสซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคได้หลายชนิด เช่น หัด หัดเยอรมัน ไข้สูกไส หูด เป็นต้น เชื้อไวรัสสามารถทำให้เกิดผื่นได้หลายโรค บางชนิดเป็นผื่นทั้งตัวบางชนิดมีผื่นเฉพาะที่

ไวรัสที่ทำให้เกิดผื่นเฉพาะที่

1. **เริม Herpes simplex** เป็นโรคผิวนังที่เกิดจากเชื้อ herpes virus [HSV] โดยโรคเริมที่เริมฝีปาก และโรคเริมที่อวัยวะเพศจะเกิดจากเชื้อด้วยกัน ลักษณะของผื่นจะเหมือนกันเชื้อ herpes virus [HSV] เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อเริมที่ผิวนัง เริมฝีปาก และอวัยวะเพศและอาจจะติดเชื้อที่ส่วนอื่นของร่างกาย และอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ได้ ลักษณะผื่นของโรค herpes จะเหมือนกันไม่ว่าเกิดที่ไหนจะเป็นตุ่มน้ำเล็กๆ บนผิวหนังที่อักเสบสีแดง

อาการ เริมต้นจะมีอาการปวดและบวมร้อนตามตำแหน่งที่ได้รับเชื้ออาการของการติดเชื้อที่ปาก และที่อวัยวะเพศจะเหมือนๆ กัน เพียงแต่ขึ้นกันคนละที่อาการจะแบ่ง เป็น การเป็นครั้งแรก Primary Infection ระยะปลดอาการ Latency and Shedding และอาการกลับเป็นซ้ำ Recurring Infections

การเป็นครั้งแรก Primary Infection เริมด้วยอาการปวดและบวมร้อน ต่อมาก็จะมีอาการบวม และอีก 2-3 วันจะมีตุ่มน้ำใสเกิดบนรูปหน้าสีแดงตุ่มน้ำแตกออกใน 24 ชั่วโมงและตกลงกระเด็น ตุ่นอาจจะรวมเป็นกลุ่มใหญ่และเป็นแผลกร้ำงทำให้ปวดมาก แพลงจะหายใน 2-3 สัปดาห์ ตำแหน่งที่พบรอบตุ่นอยู่ได้แก่ ปาก เริมฝีปาก ตา เมื่อแพลงแห้งแล้วจะไม่ติดต่อ ระหว่างที่เป็นผื่นต่อมน้ำเหลืองใกล้ๆ อาจจะโตและอาจจะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัว

ระยะปลดอาการ Latency and Shedding ช่วงนี้เชื้ออยู่ในร่างกายโดยที่ไม่เกิดอาการอะไร เชื้ออาจจะแบ่งตัวและสามารถติดต่อได้ โดยเฉพาะเชื้อที่อวัยวะเพศแม้ว่าจะไม่มีผื่น

อาการกลับเป็นซ้ำ Recurring Infections มีอาการน้อยกว่าและเป็นพื้นที่น้อยกว่าไม่ค่อยมีไข้ และมักเป็นบริเวณใกล้กับที่เดิม โดยเฉพาะที่อวัยวะเพศอาจจะกลับเป็นซ้ำได้ 5 ครั้งต่อปี

การรักษา มีการรับประทานให้เลือก 3 ตัวให้เลือกในการรักษา ยาทั้ง 3 ตัวมีได้ให้หายขาดเพียงแต่ลดความรุนแรง ลดความถี่ และลดระยะเวลาที่เป็น ยาทั้ง 3 ได้แก่ Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir การให้ยาเม็ดได้ 2 ลักษณะคือ

1. Acute therapy หมายถึงการเริมให้ยาตั้ง แต่เริมมีอาการ คือปวดและบวมร้อนโดยที่ยังไม่มีผื่นขึ้นถ้ามีผื่นขึ้นจะไม่ได้ผล ให้ยาคราว 5 วัน
2. Suppressive therapy คือการให้ยาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำจะเลือกให้ในรายที่เกิดการกลับเป็นซ้ำบ่อย หรือ

มีโรคประจำตัว สำหรับยาทายังไม่มียาทาที่ได้ผลดียาทาอาจจะได้ผลในแต่ลดอาการปวด ทำให้ผื่นแห้งเร็วๆ ที่นิยมใช้คือ acyclovir ครีมซึ่งได้ผลเฉพาะ primary lesion ยาทาไม่ช่วยลดจำนวนเชื้อหรือลดระยะเวลาที่เป็นโรค สำหรับยาอื่นต้องเลือกให้ดี เพราะอาจจะมีผล ก่อห้อส์ หรือสารที่ระคายอย่างอื่นซึ่งทำให้แพลงหาข้ามยาซึ่งมีส่วนผสมของ steroid ไม่ควรใช้เพราะแพลงหาข้าม

2.โรค眷สวัด เกิดจากไวรัส Hepes Varicella Zoster ทำให้มีการอักเสบที่เส้นประสาท อาการจะมีตุ่มน้ำขึ้นตามแนวเส้นประสาท จะมีอาการปวดแบบปวดร้อน เป็นโรคพิวนังที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า Hepes Varicella Zoster เป็นชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคไข้สูกใส ผู้ที่เป็นโรคไข้สูกสามารถจะยังคงมีเชื้อไวรัสนี้ที่ปมประสาทสันหลังซึ่งเมื่อร่างกายอ่อนแอด้วยความสามารถสร้างเพิ่มจำนวนทำให้เกิดโรค眷สวัดได้ แต่จะเกิดเฉพาะแนวประสาท ไม่ลุกลามกระจายออกไปเพราะร่างกายมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เช่นผู้สูงอายุ หรือจากโรคเช่น เอดส์ การรับประทานยา steroid จะมีโอกาสที่จะเกิดโรค眷สวัดสูง

อาการ ปวดตามตัวมักจะไม่มีไข้ ต่อมากจะมีอาการทางผิวนังอาจจะแค่คันผิวนัง บางคนปวดแบบปวดร้อน บางคนเสียวที่ผิวนัง สำหรับคนที่เป็นที่ใบหน้าจะมีอาการปวดศีรษะเห็นแสงจ้าไม่ได้ ต่อมารีบ 1-5 วันจะมีผื่นแดงอยู่เป็นกลุ่ม ต่อมาน้ำใสมักจะขึ้นอยู่ซึ่งโดยทั่วไปร่างกายตามเส้นประสาทที่เป็นโรค ตุ่มน้ำจะคงอยู่ประมาณ 5 วัน ต่อมาผื่นจะตกสะเก็ดและหายไปใน 2-3 สัปดาห์ และอาจจะทึ่ร้อยแพลงเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ ผู้ที่ได้รับยาคัดภูมิจะเป็นโรคนี้ได้บ่อยและเป็นรุนแรง

การรักษา ช่วงตุ่นใส่ให้ใช้น้ำยา Burrow หรือ bolic วางบนผื่นจะช่วยลดอาการปวด เมื่อผื่นเริ่มแห้งให้ใช้ครีมที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะท่า หากมีอาการปวดให้ใช้ยาแก้ปวด เช่น Aspirin การให้ยารับประทานควรจะให้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังเกิดผื่น ซึ่งจะทำให้ผื่นหายเร็วลดอาการเจ็บปวด และจำนวนเชื้อในตุ่น ยานี้ใช้ได้แก่ famciclovir, Valyclovir มีวัสดุที่ใช้สดเพื่อป้องกัน眷สวัด โดยจะนึ่ดในคนที่เคยเป็นไข้สูกใสแล้ว อายุมากกว่า 60 ปี พบร่วมกับความสามารถการเกิด眷สวัดได้ร้อยละ 50 และลดอาการปวด

3.瘊 เป็นโรคพิวนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า human papillomavirus ซึ่งสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยการสัมผัส การแบ่งชนิดของ瘊อาจจำแนกตามลักษณะของผื่นหรือตำแหน่งที่เกิด瘊

อาการ อาการจะเป็นก้อนที่ผิวนังลักษณะผิวอาจจะเรียบหรือขรุขระ อาจจะสีขาว ชมพู หรือสีน้ำตาล อาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้แต่ที่ๆ พบร่วมกับ คือ น้ำมือ แขน ขา

การรักษาด้วยตัวเอง พิจารณาแล้วว่าหูดเกิดจากเชื้อไวรัสหายใจได้ 65 % ในเด็ก roughly 50 หายภายใน 6 เดือน ร้อยละ 90 หายใน 2 ปี ดังนั้นการใช้ยาทาไม่ควรใช้แรงเกินไป การรักษามีหลายวิธีการเลือกใช้หนึ่งวิธี การใช้ plaster

- ใช้ plaster กันน้ำปิดบริเวณที่เป็นหูดหลายชั้น ใช้ได้ผลดีกับหูดที่เล็บ ปิดไว้ประมาณ 6 วัน
- แกะ plaster ออก 12 ชั่วโมงและติด plaster ซ้ำ
- plaster จะลดอาการและความชื้น ทำให้เชื้อไม่เจริญเติบโต

การใช้กรด salicylic

- กรด salicylic ที่ขายตามร้านขายยา มีด้วยกันสองรูปแบบ คือแบบน้ำยา หรือแบบ plaster อบน้ำยา
- บริเวณที่เป็นหูดให้แช่น้ำอุ่นประมาณ 5-10 นาที
- หลังจากนั้นใช้ตะไบเนื้อที่แข็งออก
- ทากาหรือปิด plaster

การรักษาที่โรงพยาบาล

- การขุดโดยสันมีดหรือใช้ไฟฟ้า Eletrodessication and curettage ใช้ไฟแรงไปอาจเกิดแผลเป็น
- การใช้ laser
- Cryosurgery เป็นการจีด้วย nitrogen เหลว และน้ำแข็งแห้งวิธีนี้สะดวก และไม่เกิดแผลเป็น
- การใช้ยาเคมภารที่ เช่น 40% salicylic acid, 10% Lactic acid, 30-50% Trichloroacetic acid ยามีขายที่ร้านขายยา มีสองชนิด คือ ชนิดที่เป็นแผ่นเคลือบยา และชนิดที่เป็นน้ำยาเข้มข้น วิธีการใช้ ทำการใช้ ทำความสะอาดบริเวณที่เป็นหูด แล้วติดplaster หรือทากา หลังจากนั้นจะใช้หินขัดเท้า หรือตะไบขูดเอาเนื้อตายออกทีละน้อยซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นปีในการเอาเนื้อองออกของน้ำนมด
- หูดที่เป็นตั่งใช้กรดไกรนีอนหลังใช้ยาเคมภารที่
- หูดหงอนไก่ใช้ 25% podophyllin
- หูดที่ผ่าเท้า ห้ามใช้ไฟฟ้า หรือตัดออก เพราะจะทำให้เจ็บเวลาเดิน